

仁愛醫療財團法人

R117 腸胃道出血造影檢查

(G-I bleeding scan) / (RBC scan)

檢查說明書

1. 腸胃道出血造影檢查：

利用放射性同位素製劑(Tc99m)尋找腸胃道出血點並定位。

2. 檢查流程與配合事項：

1. 若受檢者懷孕或可能懷孕時，不宜接受本檢查，請事先告知櫃檯與醫療人員。

2. 若您體重超過 100 公斤，請先聯絡核醫科做安全評估。

3. 檢查受檢者需禁食 6-8 小時。

4. 靜脈注射 Cold PYP 2 ml 後，通常經 15-20 分鐘再注射 Tc99m 20mCi 之藥物吸收後進行攝影。

5. 收取注射放射線藥劑後 5'、15'、30'、45'、1hr、2hr's、4hr's、6hr's、24hr's 之影像。

3. 可能的風險與副作用：

1. 檢查所使用的放射線同位素，對身體不會造成不良影響，也沒有過敏反應。

2. 此同位素具有微量輻射線，依據國內外文獻及實際臨床經驗，本檢查之輻射劑量，幾乎不會增加致癌機率，也不會增加不孕或後代異常的風險。

3. 檢查當日請與孕婦或 3 歲以下小孩保持 1-2 公尺距離。

4. 如果不想做這項檢查呢？

請與您的臨床醫師討論，考慮改腸胃道內試鏡檢查、電腦斷層攝影等其它可能之替代方案。

5. 如有其他問題，核子醫學科聯絡電話：(04) 24819900 轉 11151 或 11154。