

仁愛醫療財團法人

R184 前哨淋巴結掃描 (Lymphoscintigraphy for Sentinel lymph node)

檢查說明書

一、前哨淋巴結：

定位前哨淋巴結，以利外科手術時同時進行淋巴結摘取，並做進一步病理切片評估，使臨床醫師作為治療參考。

二、檢查流程與配合事項：

1. 若受檢者懷孕或可能懷孕時，不宜接受本檢查，請事先告知櫃檯與醫療人員。
2. 若您體重超過 100 公斤，請先聯絡核醫科做安全評估。
3. 檢查前不需特別禁食，可照常用餐，非洗腎患者造影前可多補充水分，但若安排同天進行手術時，則需禁食。
4. 為避免對影像結果造成誤判，受檢者身上所有的外來物件（包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品）掃描前須先取出。
5. 檢查注射部位由臨床醫師決定，注射方式採用皮下注射，由於皮下注射較為疼痛，請多見諒。約 30 分鐘後，進行掃描定位，照影定位時間約 5 分鐘。視檢查情況決定加照時間。
6. 如有前哨淋巴結出現，將會在患者皮膚上用筆作記號，請勿洗去。
7. 請穿著上衣，裙褲分開且易穿脫的衣服

三、可能的風險與副作用：

1. 檢查所使用的放射線同位素，對身體不會造成不良影響，也沒有過敏反應。
2. 此同位素具有微量輻射線，依據國內外文獻及實際臨床經驗，本檢查之輻射劑量，幾乎不會增加致癌機率，也不會增加不孕或後代異常的風險。
3. 檢查當日請與孕婦或 3 歲以下小孩保持 1-2 公尺距離。

四、如果不想做這項檢查呢：

請與您的臨床醫師討論其它可能之替代方案。

五、如有其他問題，核子醫學科聯絡電話：(04) 24819900 轉 11151 或 11154