

仁愛醫療財團法人

R116 邁克氏憩室造影檢查 Meckel's diverticulum scan

檢查說明書

1. 邁克氏憩室造影檢查：

利用放射性同位素製劑(Tc99m)尋找幼兒腸胃道出血點並定位。適應症:

1. 邁克氏憩室偵測
2. 胃殘餘偵測
3. 腹部異位性胃黏膜之偵測

2. 檢查流程與配合事項：

1. 若受檢者懷孕或可能懷孕時，不宜接受本檢查，請事先告知櫃檯與醫療人員。
2. 若您體重超過 100 公斤，請先聯絡核醫科做安全評估。
3. 受檢者需禁食 6-8 小時。(嬰孩及幼童於檢查前 2 小時勿進食即可)。
4. 靜脈注射 Tc99m 7-25mCi 之藥物吸收後進行攝影。
5. 收取注射放射線藥劑後 5'、10'、15'、30'、60'、120's 之進行不同時段之靜態造影，每次造影所需時間約為 5 分鐘左右的影像。
6. 為避免對影像結果造成誤判，受檢者上半身所有的外來物件（包含零錢、項鍊、金屬製品等）造影前需先取出。檢查前需排空膀胱。
7. 本檢查全程共需花費 2 – 3 小時以上，請預留充分時間。

3. 可能的風險與副作用：

1. 檢查所使用的放射線同位素，對身體不會造成不良影響，也沒有過敏反應。
2. 此同位素具有微量輻射線，依據國內外文獻及實際臨床經驗，本檢查之輻射劑量，幾乎不會增加致癌機率，也不會增加不孕或後代異常的風險。
3. 檢查當日請與孕婦或 3 歲以下小孩保持 1-2 公尺距離。

4. 如果不想做這項檢查呢？

請與您的臨床醫師討論，考慮改腸胃道內試鏡檢查、電腦斷層攝影、等其它可能之替代方案。

5. 如有其他問題，核子醫學科聯絡電話：(04) 24819900 轉 11151 或 11154。

仁愛醫療財團法人(大里院區)

R116 邁克氏憩室造影檢查

(Meckel's Diverticulum scan)

檢查同意書

病患：_____ 病歷號碼：_____

因醫療診斷需要，願意接受“梅克爾憩室造影”檢查。有關檢查流程及可能之風險，均已詳細閱讀檢查說明書並經貴科同仁加以解說，且充分瞭解，必要時同意醫師進行適當之處置。

此 致

仁愛醫療財團法人(大里院區)

立同意書人：_____ 身分證字號：_____

與患者關係：_____ 電話：_____

中 華 民 國 年 月 日