

仁愛醫療財團法人

R130 睪丸造影檢查 (Scrotal Scan)

檢查說明書

1. 睪丸造影檢查：

檢查目的：（1）鑑別診斷睪丸扭轉或發炎。（2）陰囊水腫或靜脈曲張之診斷。

2. 檢查流程與配合事項：

1. 若受檢者懷孕或可能懷孕時，不宜接受本檢查，請事先告知櫃檯與醫療人員。
2. 檢查開始先請受檢者之睪丸完全暴露，兩大腿外展，並用膠帶將陰莖固定於上側
3. 進行靜脈注射 Tc-99m 5-10mCi（成人劑量），於核醫造影儀器下進行照相，觀察睪丸血流情形，由核醫電腦收集資料作影像處理與分析。造影 15-20 分鐘。
4. 受檢者不需禁食。
5. 檢查後多喝水多排尿可加速部分輻射劑量排出。

3. 可能的風險與副作用：

1. 檢查所使用的放射線同位素，對身體不會造成不良影響，也沒有過敏反應。
2. 此同位素具有微量輻射線，依據國內外文獻及實際臨床經驗，本檢查之輻射劑量，幾乎不會增加致癌機率，也不會增加不孕或後代異常的風險。
3. 檢查當日請與孕婦或 3 歲以下小孩保持 1-2 公尺距離。

4. 如果不想做這項檢查呢？

請與您的臨床醫師討論其它可能之替代方案。

5. 如有其他問題，核子醫學科聯絡電話：（04）24819900 轉 11151 或 11154。